



## Augmentation mammaire composite Genève Suisse

### Description

Après un moratoire sur l'utilisation des implants remplis de gel de silicone, les implants remplis de solution saline sont devenus populaires dans les années 1990. La solution saline n'a pas de viscosité, de sorte que ces implants offrent un contact plus étroit et moins élastique avec le tissu mammaire environnant que les implants en silicone. Cet inconvénient des implants salins a souvent provoqué l'insatisfaction des patientes, notamment lorsque des implants remplis de sérum physiologique ont été utilisés pour augmenter de très petits seins. On a constaté que les implants remplis de solution saline étaient palpables à travers la peau fine des seins de ces patientes, même s'ils étaient placés sous les muscles pectoraux.

## Augmentation mammaire combinée avec implants et lipofilling

Le lipofilling a souvent été utilisé pour l'augmentation mammaire. Cependant, comme le montre l'histoire du lipofilling, un certain nombre de complications sont possibles pour cette méthode. Les études cliniques ont souligné les problèmes liés à la résorption postopératoire imprévisible, à la nécrose graisseuse, à la calcification et à la formation de kystes. La possibilité de transplanter une quantité limitée de graisse dans une zone bien vascularisée était justifiée. Le principal problème était la difficulté d'introduire suffisamment de graisse pour obtenir le volume souhaité. C'était un problème lorsque seules les greffes de graisse étaient utilisées pour les patientes aux petits seins.

## Implants et lipofilling

Cependant, la combinaison des deux procédures susmentionnées, le lipofilling mammaire et l'augmentation mammaire par implants, peut éliminer les problèmes associés à l'une ou l'autre méthode.

## Technique d'op ration

L'op ration se fait sous anesth sie g n rale. La graisse est pr lev e sur des sites donneurs, L'intervention est r alis e sous anesth sie g n rale et sous anesth sie g n rale   l'aide de canules de lipofilling. L'aspirat est rinc  plusieurs fois avec une solution physiologique pour  liminer le composant sanguin. La graisse collect e sera plac e dans plusieurs seringues d'injection de 20 cm<sup>3</sup>. Par de petites ponctions, la graisse est ensuite inject e dans le sein   l'aide d'une fine canule   bout  mouss  (2,0 mm de diam tre).

Il est important d'injecter une petite quantit  de graisse   chaque endroit pour que les cellules soient suffisamment nourries. De cette mani re, la graisse est transplant e dans de nombreuses zones de la poitrine, notamment dans le tissu sous-cutan , le fascia pectoral et le muscle pectoral. Une fois l'injection termin e, le sein est mass  pour r partir uniform ment le produit inject . Ensuite, on choisit un acc s, par exemple dans l'aisselle, o  l'on pratique une incision et o  l'on forme une cavit  d'implantation sous le muscle grand pectoral (subpectral). Au d but de l'op ration, la solution de Klein est inject e dans l'espace sous-pectoral pour minimiser les saignements pendant l'op ration. Un implant en silicone rempli de gel de silicone ou de solution physiologique est ensuite ins r  dans la poche axillaire (rarement).

## Cas clinique

Patiente de 23 ans pr sentant une hypoplasie mammaire. Elle souhaitait une augmentation mammaire importante. Une intervention chirurgicale avec des implants de plus de 300 ml pour obtenir le volume souhait   tait d finitivement indiqu e. Cependant, sa petite glande mammaire et son mince tissu adipeux sous-cutan  n'ont pu dissimuler la palpabilit  des implants. Il a donc  t  d cid  de recourir   une augmentation mammaire combin e (complexe, composite) : lipofilling du sein associ    une augmentation mammaire par implants. Quatre cents millilitres de graisse ont  t  pr lev s par liposuccion de l'abdomen, des fesses et des cuisses. Deux cents millilitres d'aspirat ont  t  inject s dans chaque sein.

En utilisant un acc s transaxillaire standard, les implants, d'un volume de 250 ml, ont  t  plac s sous le muscle grand pectoral. La r ducation postop ratoire du patient s'est d roul e sans complications. Imm diatement apr s l'op ration, on a constat  une augmentation significative de l'augmentation mammaire. Une tomodynam trie (TDM) postop ratoire d'une semaine a montr  un  paississement significatif du tissu mammaire recouvrant la proth se plac e en sous-pectoral.

## Implants et lipofilling

Au cours des 3 semaines suivantes, une r gression de la pl nitude des seins a  t  observ e.   ce moment-l , les seins avaient perdu plus de la moiti  du volume de graisse inject e. Apr s cela, la r sorption a ralenti. Un scanner postop ratoire de 2 mois n'a montr  aucune formation de kyste dans le sein. Le tissu mammaire avait perdu un volume consid rable, environ deux tiers de la graisse transplant e, par rapport au volume 1 semaine apr s l'op ration. Cette perte de volume  tait  vidente   l'observation clinique.

## Implants et lipofilling

Seule une petite quantité de graisse injectée reste dans le tissu sous-cutané et le tissu mammaire. Néanmoins, la graisse restante a permis de cacher les bords palpables des implants. La patiente était satisfaite de ses nouveaux seins et également satisfaite de la silhouette résultant de la liposuction effectuée. L'observation clinique et un scanner réalisés après 2 ans ont montré que le résultat reste stable dans le temps.

Voir ce site internet de chirurgien esthétique genevois :

<https://www.tobalem.com/traitements/augmentation-mammaire-par-protheses/> et vous en saurez plus encore !

### Categorie

1. Augmentation mammaire

### Tags

1. Clinique Tobalem

### Date

2026/05/28

date créée

2021/11/15

### Auteur

blogueur

default watermark